



Griep (influenza) en het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen?



Griep



COVID-19

Verschillen

Overeenkomsten

Influenzavirus	SARS-CoV2	Virus	
	Verlies van reuk en smaak, darmklachten	Klachten	Koorts, hoesten, benauwdheid, keelpijn, loopneus, spierpijn
1-4 dagen na besmetting	2-14 dagen na besmetting	Hoe lang duurt het voor je klachten krijgt?	
Jonge kinderen		Risicogroepen	Onder andere ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen
1 dag voor symptomen tot 7 dagen na start van klachten	2 dagen voor symptomen ten minste 7 dagen na start van de klachten	Besmettelijke periode*	
		Verspreiding	Verspreiding via druppels die bijvoorbeeld verspreid kunnen worden door hoesten/niezen. Eventuele verspreiding via handen en contact met slijmvliezen.
	Bloedpropjes (trombose)	Complicaties	Longontsteking, ademhalingsproblemen, secundaire bacteriële infecties
Jaarlijks griepvaccin	vaccinatiecampagne 2021	Vaccin	

* De besmettelijke periode kan soms langer zijn bij een langere ziekte duur of bij immuungecompromitteerden.